

Bereidingsfiche Furosemide suspensie (10 mg/mL) a.h.v. Liquifine® Alkalic Dry



Fusie van:



distributeur:



Bereidingsinstructies

1. Weeg de vereiste hoeveelheid Liquifine® Alkalic dry (6.3 gram per 100 ml suspensie) af en breng over naar het eindreceptiënt^(*)
 2. Weeg de vereiste hoeveelheid furosemide af en breng over naar het eindreceptiënt
 3. Schud krachtig
 4. Leng aan tot het gewenste eindvolume met gezuiverd water en schud krachtig
- (*) U kan ook vertrekken van de 100 mL flesjes met maatstreep waarin reeds de vereiste hoeveelheid Liquifine® Alkalic dry is afgewogen

Bereidingsverslag

Bereidingsdatum	/ /	Galenische vorm	Suspensie
Lotnummer		Volume	
Grondstof	Nummer grondstoffenregister	Hoeveelheid af te meten	Hoeveel afgemeten
Furosemide		g	g
Liquifine® Alkalic dry		g	g
Gezuiverd water		Ad mL	Ad mL

Tarra

• _____

Kwaliteitscontrole

• Homogeniteit: _____

Houdbaarheid

- 30 dagen

Bewaring en etikettering

- Buiten invloed van licht – koelkast
- Schudden voor gebruik

Naam en handtekening bereider	Naam en handtekening apotheker

MAGIS PHARMA

Keizershoek 336, 2550 Kontich, T: +32 3 457 11 76, F: +32 3 457 43 40
info@magis-pharma.be, www.magis-pharma.be