

Bereidingsfiche Vancomycine suspensie (25-50 mg/mL) a.h.v. Liquifine® pH 4 orange 500 mL



Fusie van:



distributeur:



Bereidingsinstructies

1. Weeg de vereiste hoeveelheden vancomycine af
2. Breng +/- 20 mL Liquifine® pH 4 orange over in de mortier.
3. Verwrijf geleidelijk aan de afgewogen hoeveelheid vancomycine.
4. Voeg Liquifine® pH 4 orange toe (volgens de geometrische dilutiemethode) tot het gewenste eindvolume

Bereidingsverslag

Bereidingsdatum	/ /	Galenische vorm	Suspensie
Lotnummer		Volume	
Grondstof	Nummer grondstoffenregister	Hoeveelheid af te meten	Hoeveel afgemeten
Vancomycine		g	g
Liquifine® pH 4 orange		Ad mL	Ad mL

Tarra

• _____

Kwaliteitscontrole

• Homogeniteit: _____

Houdbaarheid

• 180 dagen

Conservation et étiquetage

- Buiten invloed van licht - Koelkast
- Schudden voor gebruik

Naam en handtekening bereider	Naam en handtekening apotheker

MAGIS PHARMA

Keizershoek 336, 2550 Kontich, T: +32 3 457 11 76, F: +32 3 457 43 40
info@magis-pharma.be, www.magis-pharma.be