

Bereidingsfiche

Furosemide suspensie (10 mg/mL) a.h.v. Liquifine® pH4 liquid



Bereidingsinstructies

1. Weeg de vereiste hoeveelheden furosemide en 4,04 gram natriumwaterstofcarbonaat (per 100 mL suspensie) af. Verwrijf beide poeders tot een homogeen mengsel.
2. Bevochtig het poedermengsel met een geringe hoeveelheid Liquifine® pH4 liquid en verwrijf.
3. Voeg Liquifine® pH4 liquid toe (volgens de geometrische dilutiemethode) tot het gewenste eindvolume.

Bereidingsverslag

Bereidingsdatum	/ /	Galenische vorm	Suspensie
Lotnummer		Volume	
Grondstof	Nummer grondstoffenregister	Hoeveelheid af te meten	Hoeveel afgemeten
Furosemide		g	g
Natriumwaterstofcarbonaat		g	g
Liquifine® pH4 liquid		Ad mL	Ad mL

Tare

- _____

Kwaliteitscontrole

- Homogeniteit: _____

Houdbaarheid

- 90 dagen

Bewaring en etikettering

- Buiten invloed van licht – Kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik

Naam en handtekening bereider	Naam en handtekening apotheker

MAGIS-PHARMA

Neerlandweg 24, 2610 Wilrijk, T: +32 3 457 11 76
info@magis-pharma.be, www.magis-pharma.be