

Fiche de préparation

Furosémide suspension

(10 mg/mL) en Liquifine® Alkalic Dry



Instructions de préparation

1. Peser la quantité requise de Liquifine® Alkali dry (6,3 g pour 100 mL de suspension) et la transférer dans le récipient final (*).
 2. Peser la quantité requise de furosémide et la transférer également au récipient final.
 3. Bien agiter.
 4. Ajouter de l'eau purifiée au volume souhaité et agiter fermement jusqu'à l'obtention d'une dispersion homogène.
- (*) Vous pouvez également utiliser les flacons préremplis de 100 mL ou 200 mL avec trait de repère, qui contiennent déjà la quantité requise de Liquifine® Alkalic dry.

Fiche de préparation

Date de préparation	/ /	Forme galénique	Suspension
Lot		Volume	
Component	Numero du registre des composants	Quantité à peser	Quantité pesée
Furosémide		g	g
Liquifine® Alkalic dry		g	g
Eau purifiée		Ad mL	Ad mL

Tare

• _____

Côntrole de qualité

• Homogénéité: _____

Durée de conservation

• 60 jours

Conservation et étiquetage

- À l'abri de la lumière – Réfrigérateur
- Agiter avant utilisation

Nom et signature du responsable de la préparation	Nom et signature du pharmacien

MAGIS-PHARMA

Neerlandweg 24, 2610 Wilrijk, T: +32 3 457 11 76
info@magis-pharma.be, www.magis-pharma.be