

Bereidingsfiche

Metronidazole suspensie

(50 mg/mL) a.h.v. Liquifine® pH4 liquid 500 mL



Bereidingsinstructies

1. Weeg de vereiste hoeveelheden metronidazole af.
2. Verwrijf indien nodig tot een fijn poeder.
3. Bevochtig het poeder met een geringe hoeveelheid Liquifine® pH4 liquid en verwrijf.
4. Voeg Liquifine® pH4 liquid toe (volgens de geometrische dilutiemethode) tot het gewenste eindvolume.

Bereidingsverslag

Bereidingsdatum	/ /	Galenische vorm	Suspensie
Lotnummer		Volume	
Grondstof	Nummer grondstoffenregister	Hoeveelheid af te meten	Hoeveel afgemeten
Metronidazole		g	g
Liquifine® pH4 liquid		Ad mL	Ad mL

Tare

• _____

Kwaliteitscontrole

• Homogeniteit: _____

Houdbaarheid

• 180 dagen

Bewaring en etikettering

- Buiten invloed van licht – Kamertemperatuur
- Schudden voor gebruik

Naam en handtekening bereider	Naam en handtekening apotheker

MAGIS-PHARMA

Neerlandweg 24, 2610 Wilrijk, T: +32 3 457 11 76
info@magis-pharma.be, www.magis-pharma.be